R3-03 遺伝の規則性（メンデル）

 組 番 氏名＿＿＿＿＿＿

顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a とする。(1)〜(4) は組み合わせを **AA・Aa・aa の順**に比とともに、(5)〜(7) は比を、(8)〜(10) は**数値だけ**を書きなさい。

遺伝子の表し方	顕性（優性）の形質を現す遺伝子を **A**、潜性（劣性）の形質を現す遺伝子を **a** と書く。子は両親から 1 つずつ遺伝子を受けつぐ
形質の出方	**AA・Aa は顕性形質**、**aa だけが潜性形質**を現す
分離の法則	対になっている遺伝子は、生殖細胞ができるとき**分かれて別々の細胞に入る**
答え方	組み合わせは **AA・Aa・aa の順**に、比とともに書く（例 AA:Aa＝1:1）。1 種類しか出ないときは記号だけを書く

(1) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **AA** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(2) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(3) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(4) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **AA** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿

(5) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 ＿＿＿＿＿＿

(6) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 ＿＿＿＿＿＿

(7) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **AA** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 ＿＿＿＿＿＿

(8) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **400** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 ＿＿＿＿＿＿

(9) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **2000** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 ＿＿＿＿＿＿

(10) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **1600** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 ＿＿＿＿＿＿

解答は裏面

遺伝の規則性（メンデル） <解答>

顕性の遺伝子を A、潜性の遺伝子を a とする。(1)〜(4) は組み合わせを **AA・Aa・aa の順**に比とともに、(5)〜(7) は比を、(8)〜(10) は**数値だけ**を書きなさい。

遺伝子の表し方	顕性（優性）の形質を現す遺伝子を **A**、潜性（劣性）の形質を現す遺伝子を **a** と書く。子は両親から 1 つずつ遺伝子を受けつぐ
形質の出方	**AA・Aa は顕性形質**、**aa だけが潜性形質**を現す
分離の法則	対になっている遺伝子は、生殖細胞ができるとき**分かれて別々の細胞に入る**
答え方	組み合わせは **AA・Aa・aa の順**に、比とともに書く（例 AA:Aa=1:1）。1 種類しか出ないときは記号だけを書く

(1) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **AA** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 **Aa**

Aa 4

(2) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 **AA:Aa:aa=1:2:1**

AA 1 Aa 2 aa 1

(3) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 **Aa:aa=1:1**

Aa 2 aa 2

(4) 子の遺伝子 遺伝子の組み合わせが **AA** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる遺伝子の組み合わせを書きなさい。

答 **AA:Aa=1:1**

AA 2 Aa 2

(5) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 **3:1**

子は AA:Aa:aa=1:2:1。aa だけが潜性形質

(6) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 **1:1**

子は Aa:aa=1:1。aa だけが潜性形質

(7) 形質の比 遺伝子の組み合わせが **AA** と **aa** の親をかけ合わせた。子に現れる**顕性形質：潜性形質**の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい（潜性が出ないときは 1:0）。

答 **1:0**

子は Aa。aa だけが潜性形質

(8) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **400** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 **100**

潜性は 3:1 のうちの潜性ぶん → 100 個体

(9) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **Aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **2000** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 **500**

潜性は 3:1 のうちの潜性ぶん → 500 個体

(10) 個体数 遺伝子の組み合わせが **Aa** と **aa** の親をかけ合わせ、子が全部で **1600** 個体できた。潜性形質を現すものはおよそ何個体か。

答 **800**

潜性は 1:1 のうちの潜性ぶん → 800 個体